



GENERALITAT VALENCIANA

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL



SanitatVegetal

OLIVO

Aviso de tratamiento

Repilo

Es una enfermedad causada por el hongo *Fusicladium oleagineum* (*Spilocea oleagina*, anteriormente). Los síntomas más característicos de la enfermedad consisten en manchas circulares de color oscuro, rodeadas en ocasiones por un halo amarillento que se desarrollan en el haz de las hojas. En el envés aparecen manchas difusas que son menos distintivas.

Como medidas culturales preventivas, es muy importante realizar la poda de forma que se favorezca la aireación del interior del árbol, para que las hojas se mantengan húmedas el menor tiempo posible. También es importante ser cuidadoso con el abono nitrogenado ya que este, en exceso, favorece el desarrollo de la enfermedad.

Las épocas de mayor sensibilidad a esta enfermedad son primavera y otoño, épocas con temperaturas medias y humedades relativas elevadas; es, por tanto, en estas épocas cuando deben hacerse tratamientos en caso de ser necesarios. En zonas de nieblas persistentes o en las que se observe la presencia de la enfermedad, se recomienda realizar tratamientos fungicidas preventivos con alguno de los productos siguientes:



- Productos penetrantes: bentiavalicarb, difeconazol, dodina, kresoxim-metil, tebuconazol, trifloxistrobin.
- Productos de contacto: compuestos de cobre, mancozeb, compuestos de cobre + fungicidas orgánicos (mancozeb, propineb)

Silla (Valencia), 7 de marzo de 2017

