

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2010, del director general d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària, per la qual es modifiquen les normes per a la producció integrada en vinya, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2010/5057]

En la Resolució de 17 de gener de 2008, del director general d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària, es van establir les normes per a la producció integrada en vinya en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5696, de 5 de febrer de 2008), l'annex VI de la qual, «Estratègia de control integrat», va ser modificat per mitjà de la Resolució d'11 d'agost (DOCV núm. 5826, de 12 d'agost de 2008, i DOCV núm. 5831, de 20 d'agost de 2008). Estes normes continuen vigents en l'actualitat.

L'experiència adquirida, així com l'adequació de la normativa a l'evolució del cultiu de la vinya, especialment quant a productes fitosanitaris, aconsellen actualitzar estes normes tècniques.

Atés que les normes tècniques complixen, en general, els requisits exigits en el Reial Decret 1201/2002, de 20 de novembre, pel qual es regula la producció integrada de productes agrícoles, especialment les disposicions dels articles 3 a 8 i dels annexos, on s'establixen les exigències comunes o mínimes de la producció integrada, però que cal adaptar en alguns aspectes.

Atés les disposicions de l'article 2 de l'Orde de 23 de maig de 1997, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, sobre reglamentació de les produccions obtingudes per tècniques d'agricultura integrada, que faculta el director general d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària per a dictar les disposicions de desplegament necessàries per a l'aplicació de les disposicions de l'orde esmentada, resolc:

Modificar les resolucions de 17 de gener de 2008 i d'11 d'agost de 2008, que estableixen les normes per a la producció integrada de vinya a la Comunitat Valenciana de la manera següent:

Primer

Pràctica: maneig del sòl i control de males herbes

Norma estricta o prohibició

On diu:

«L'elecció del producte a utilitzar dependrà del tipus de mala herba a controlar i del seu estat de desenvolupament. Només es permeten els herbicides assenyalats en l'annex V i en les condicions d'ús allí especificades»;

Ha de dir:

«L'elecció del producte a utilitzar dependrà del tipus de mala herba a controlar i del seu estat de desenvolupament. Els herbicides permisos són els autoritzats per al cultiu de la vinya en el Registre Oficial de Productes Fitosanitaris del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí».

Segon

Pràctica: elaboració de vi i altres productes procedents de raïm

Norma estricta o prohibició

On diu:

«La utilització d'anhidrid sulfurós no ha de sobrepassar, al final de la fermentació, els 225 mg/l (blancs i rosats) o els 175 mg/l (negres), ni en estat lliure els 50 i 30 mg/l en estos tipus de vins respectivament, s'ha de respectar en tot cas la legislació vigent, així com les normes establides per les denominacions d'origen o altres figures de qualitat reconegudes»;

Ha de dir:

«L'ús d'anhidrid sulfurós no ha de sobrepassar, al final de la fermentació, els 200 mg/l (blancs i rosats) o els 150 mg/l (negres), i cal respectar en tot cas la legislació vigent i les normes establides per les denominacions d'origen o altres figures de qualitat reconegudes».

Tercer

L'annex VI, «Estratègia de control integrat», se substituïx per l'annex VI que s'hi adjunta.

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2010, del director general de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, por la que se modifican las normas para la producción integrada en vid, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2010/5057]

La Resolución de 17 de enero de 2008, del director general de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, estableció las normas para la producción integrada en vid en el ámbito de la Comunitat Valenciana, (DOCV nº 5696 de 5 de febrero de 2008), cuyo anexo VI «Estrategia de control Integrado», fue modificado mediante Resolución de 11 de agosto (DOCV nº 5826 de 12 de agosto de 2008 y DOCV nº 5831 de 20 de agosto de 2008). Dichas normas continúan vigentes en la actualidad

La experiencia adquirida, así como la adecuación de la normativa a la evolución del cultivo de la viña, especialmente en cuanto a productos fitosanitarios, aconsejan actualizar dichas normas técnicas.

Considerando que las normas técnicas cumplen, en general, con los requisitos exigidos en el Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la producción integrada de productos agrícolas, en especial en lo dispuesto en los artículos 3 a 8 y en los anejos, donde se establecen las exigencias comunes o mínimas de la producción integrada, pero deben adaptarse en algunos aspectos.

Considerando lo dispuesto en el artículo 2 de la Orden de 23 de mayo de 1997, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre reglamentación de las producciones obtenidas por técnicas de agricultura integrada, que faculta al director general de Investigación y Tecnología Agroalimentaria para dictar las disposiciones de desarrollo necesarias para la aplicación de lo dispuesto en dicha orden, resuelvo:

Modificar las Resoluciones de 17 de enero de 2008 y de 11 de agosto de 2008 que establecen las normas para la producción integrada de vid en la Comunitat Valenciana de la siguiente manera:

Primer

Práctica: manejo del suelo y control de malas hierbas

Norma estricta o prohibición

Donde dice:

«La elección del producto a utilizar dependerá del tipo de mala hierba a controlar, y de su estado de desarrollo. Sólo se permiten los herbicidas señalados en el anexo V y en las condiciones de uso allí especificadas»;

Debe decir:

«La elección del producto a utilizar dependerá del tipo de mala hierba a controlar, y de su estado de desarrollo. Los herbicidas permitidos son aquellos autorizados para el cultivo de la viña en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino».

Segundo

Práctica: elaboración de vino y otros productos procedentes de uva

Norma estricta o prohibición

Donde dice:

«La utilización de anhídrido sulfuroso no debe sobreponerse, al final de la fermentación los 225 mg/l (blancos y rosados) o los 175 mg/l (tintos), ni en estado libre los 50 y 30 mg/l en estos tipos de vinos respectivamente, debiendo respetarse en todo caso la legislación vigente, así como las normas establecidas por las Denominaciones de Origen u otras figuras de calidad reconocidas»;

Debe decir:

«La utilización de anhídrido sulfuroso no debe sobreponerse, al final de la fermentación los 200 mg/l (blancos y rosados) o los 150 mg/l (tintos), debiendo respetarse en todo caso la legislación vigente, así como las normas establecidas por las Denominaciones de Origen u otras figuras de calidad reconocidas».

Tercero

El anexo VI: estrategia de control integrado se sustituye por el anexo VI que se adjunta.

ANNEX VI
Estratègia de control integrat

PLAGA	METODOLOGIA SEGUIMENT (*)	CRITERIS D'INTERVENCIÓ: LLINDARS	CONTROL QUÍMIC O BIOTÈCNIC: MATÈRIES ACTIVES	CONTROL BIOLÒGIC I FAUNA AUXILIAR	MÈTODES CULTURALS
Cucs del raïm <i>Lobesia botrana</i>	Captures d'adults en paranyos sexuals i/o alimentaris i observació d'ous i larves en 100 xanglots (4 xanglots/cep de diferents orientacions, en 25 ceps).	En 1a generació no es recomana intervindre. En 2a i 3a generació en raïm de taula cal intervindre en superar l'1% de xanglots atacats. En raïm de vinificació cal intervindre quan se supere el 10% de xanglots amb presència de plaga en 2a generació i el 5% en 3a generació.	Confusió sexual (R) Tebufenocida (R) Flufenoxuron (R) Metoxifenocide (R) Clorpirifòs (1) Metil clorpirifòs (1) (6) Spinosad (R) Fenoxicarb Indoxacarb (9) Aplicació, si és possible, localitzada en els xanglots. Màxim 2 aplicacions contra cada una de les generacions carpòfiles.	<i>Bacillus thuringiensis</i> (R) <i>Dibrachys affinis</i> <i>Dibrachys cavus</i> <i>Campoplex capitator</i> <i>Crysopa carnea</i> Coccinèl-lids	Poda en verd (esfullament i escavallament) per a facilitar la ventilació i l'exposició dels xanglots.
Cotonet <i>Planococcus citrii</i>	A l'hivern cal observar el percentatge de ceps amb presència de l'insecte. En vegetació cal observar el percentatge de brots i/o xanglots atacats a partir del quallat de fruits.	Cal intervindre només en raïm de taula. S'efectuarà el tractament hivernal quan se supere el 3% de ceps atacats. En vegetació es tractarà quan se supere el 2% de brots o l'1% de xanglots atacats aprofitant el tractament contra la 2a generació de cucs de raïm.	Clorpirifòs (1) Imidacloprid (1) Metil clorpirifòs (hivern). Es recomana, si és possible, l'aplicació a fogars o rodals o només a les plantes afectades. Màxim 2 tractaments en vegetació.	<i>Crytolaemus montrouzieri</i> <i>Leptomastix dactylopii</i> <i>Anagyrus pseudococcii</i> <i>Leptomastoidea abnormis</i> <i>Prochiloneurus bolivari</i> <i>Signiphora conjugalis</i> <i>Coccinella septempunctata</i> <i>Chilocorus bipustulatus</i> <i>Scymus</i> sp.	Escorçament de troncs i braços durant l'hivern i crema posterior de les restes. Poda en verd per a afavorir l'aireig i impedir l'excessiu ombreig.

ANNEX VI
Estratègia de control integrat (cont. 2)

PLAGA	METODOLOGIA SEGUIMENT (*)	CRITERIS D'INTERVENCIÓ: LLINDARS	CONTROL QUÍMIC O BIOTÈCNIC: MATÈRIES ACTIVES	CONTROL BIOLÒGIC I FAUNA AUXILIAR	MÈTODES CULTURALS
Mosquit verd <i>Empoasca sp.</i> <i>Jacobiasca sp.</i>	Trampes cromotòpiques grogues. S'observarà el nombre d'insectes per fulla (en 100 fulles de la zona intermèdia del sarment) abans de tractar la 2a i 3a generació de cucs del raïm.	En detectar augmentos importants de captures en trampes i quan se supere 2 insectes/fulla en 2a gen. de cucs de raïm i 1 insecte/fulla en 3a gen. de cucs de raïm.	Flufenoxuron (R) Clorpirifòs (1) Acrinatrín (12) Imidacloprid (1) Màxim 2 aplicac./any excepte casos excepcionals.	<i>Anagrus atomus</i>	
Trips de Califòrnia <i>Frankliniella occidentalis</i>	S'observarà el nombre de formes mòbils després de colpejar 100 xanglots des de l'inici de la floració fins una setmana després de finalitzada la floració. Trampes cromotòpiques blaves.	Només es tractarà en raïm de taula amb un llindar de 0,25 formes mòbils per xanglot.	Metiocarb (2) (fins a floració) Spinosad (R) Acrinatrín (12) Màxim 1 aplicació/any.	<i>Orius sp.</i> <i>Crysopa sp.</i>	Cal eliminar les males herbes abans de l'estat fenològic D-E (eixida i extensió de fulles), però no durant el període de floració-quallat.
Cucs grisos <i>Agrotis sp. i altres</i>	Observació de ceps durant el desborrament, observació dels primers danys en la brotació.	Si s'hi observen gemmes mossegades.	Clorpirifòs	<i>Apanteles rufator</i> <i>Ichneumon sarcitorius</i> <i>Amblyteles armatus</i> <i>Campoletis annulata</i> <i>Entomophthora megasperma</i> <i>Meteorus rubens</i>	Cal mantindre les males herbes a la primavera fins a l'estat E, almenys en la filera, i eliminar-les a l'estiu.
Hàltica <i>Haltica ampelophaga</i>	Observació d'adults i postes en brots i fulles des de l'inici de la brotació fins a la floració.	Normalment no requereix intervenció pel control biològic natural.	Clorpirifòs (1)	<i>Zicrona caerulea</i>	

ANNEX VI
Estratègia de control integrat (cont. 3)

PLAGA	METODOLOGIA SEGUIMENT (*)	CRITERIS D'INTERVENCIÓ: LLINDARS	CONTROL QUÍMIC O BIOTÈCNIC: MATÈRIES ACTIVES	CONTROL BIOLÒGIC I FAUNA AUXILIAR	MÈTODES CULTURALS
Castanyola <i>Vesperus xatarti</i>	Paranys lluminosos i/o sexuals de captura d'adults. S'observarà el percentatge d'eclosió d'ous en ceps ocupats o paranys de posta.	On s'observen símptomes de dany cal realitzar un tractament a l'eclosió de primers ous. El tractament serà localitzat en el sòl al voltant del cep.	Clorpirifòs Màxim 1-2 aplicac./any.	Nemàtodes <i>Steinerma</i>	Paranys de posta a la tardor i retirada a l'hivern. Cal eliminar els ceps molt atacats.
Pugons	Observació de 100 brots i 100 xanglots des de prefloració (estat G) fins a granadaria pésol. Màxima sensibilitat en floració-quallat.	Quan se sobrepassse el 5-10% de xanglots amb presència de pugó.	Imidacloprid, només en el període de floració-quallat.	Coccinèl·lids Crisopa	Poda en verd.
Mosca de la fruita <i>Ceratitis capitata</i> i altres dipters	Captures en paranys alimentaris i/o sexuals. Observació del percentatge de xanglots atacats.	Només en raïm de taula a primeres captures i/o quan se supere l'1% de xanglots atacats.	Captura massiva d'adults en paranys alimentaris i/o sexuals.		Cal eliminar fruites afectades. Control de fruiters pròxims.
Aranya groga tacada <i>Tetranychus urticae</i>	Observació del percentatge de ceps amb símptomes i complementàriament la presència de formes mòbils en fulles des d'inici de floració fins inici de verol.	-En raïm de taula cal tractar en observar els primers fogars, preferiblement de forma localitzada. Si l'atac és generalitzat s'actuarà en tota la parcel·la.	Hexitiazox (2) Fenbutestan (2) Acrinatrin (12) Propargita (2) (6) Clofentecin (6) Fenpiroximat (2) Spirodiclofen (11) Cal procurar realitzar el tractament només als fogars inicials.	En general, important i suficient: <i>Typhlodromus phialatus</i> <i>Euseius scutalis</i> <i>Euseius stipulatus</i> <i>Amblyseius californicus</i> <i>Amblyseilla setosa</i> <i>Typhlodromus piri</i>	Cal eliminar les males herbes abans de l'inici de la brotació. Cal triar els plaguicides contra altres plagues menys perjudicials per als fitoseids útils.

ANNEX VI
Estratègia de control integrat (cont. 4)

PLAGA	METODOLOGIA SEGUEI MENT (*)	CRITERIS D'INTERVENCIÓ: LLINDARS	CONTROL QUÍMIC O BIOTÈCNIC: MATÈRIES ACTIVES	CONTROL BIOLÒGIC I FAUNA AUXILIAR	MÈTODES CULTURALS
Aranya groga tacada <i>Tetranychus urticae</i>		<p>- En raïm de vinificació cal actuar només quan se sobrepassen estos llindars:</p> <p>Inici de floració: 5% de ceps amb síntomes.</p> <p>Tract. 2a gen. de cucs del raïm: 25% de ceps amb síntomes.</p> <p>2-3 setmanes més tard: 40% de ceps amb síntomes.</p>	Màxim 2 aplicac./any.	<i>Typhlodromus rhenanoides</i> <i>Phytoseiulus persimilis</i> <i>Anthoseius rhenanoides</i> <i>Amblyseius isotrichus</i> <i>Typhlodromus carmonae</i> <i>Stethorus punctillum</i> <i>Crisopa</i>	
Aranya roja <i>Panonychus ulmi</i>	<p>A l'hivern cal observar el percentatge de brocades ocupades per postes.</p> <p>En vegetació cal observar el percentatge de fulles ocupades per formes móbils.</p>	<p>S'actuarà quan se sobrepassen estos nivells:</p> <p>Hivern: 20% brocades ocupades.</p> <p>Vegetació: estats E/F fins a l'estiu: 20-25% fulles ocupades.</p> <p>Parada estiu: 15-20% fulles ocupades.</p>	Hexitiazox (2) Fenbutestan (2) Acrinatrin (8) Propargita (2) (6) Fenpiroximat (2) Piridaben (2) Clofentecin (6) Spirodiclofen (11) Màxim 2 aplicac./any.	La mateixa que l'aranya groga tacada, que sol controlar de forma natural la plaga.	Cal cremar la fusta de poda. Cal triar els plaguicides contra altres plagues menys perjudicials per als seus enemics naturals (fitoseids).
Brevipalp <i>Brevipalpus lewisi</i> Erinosi de la vinya <i>Eriophyes vitis</i>	Observació del percentatge de brots o xanglotos afectats en prefloració.	No superar l'1% en raïm de taula o el 5% en raïm de vi de brots o xanglotos afectats, en el cas del brevipalp, i síntomes notables en brotació en el cas de l'erinosi.	Sofre en empolvorament (R) (4). Màxim 1 aplicació/any.		

ANNEX VI
Estratègia de control integrat (cont. 5)

PLAGA	METODOLOGIA SEGUIMENT (*)	CRITERIS D'INTERVENCIÓ: LLINDARS	CONTROL QUÍMIC O BIOTÈCNIC: MATÈRIES ACTIVES	CONTROL BIOLÒGIC I FAUNA AUXILIAR	MÈTODES CULTURALS
Acariosi de la vinya <i>Calipitrimerus vitis</i>	Observació de 100 fulles terminals a contrallum en vegetació. Observació de 100 gemmes després de la poda hivernal.	50-100 àcar/fulla en vegetació o 1-3 àcar/gemma a l'hivern.	En vegetació: Sofre en empolvorament (R) (4) (9) Màxim 1 aplicació/any.	<i>Typhlodromus pyri</i>	Cal cremar les restes de poda. No s'ha d'empeltar sarments de parcel·les atacades.

MALALTIA	METODOLOGIA SEGUIMENT (*)	ESTRATÈGIA D'INTERVENCIÓ	CONTROL QUÍMIC O BIOTÈCNIC: MATÈRIES ACTIVES	MÈTODES CULTURALS
Míldiu <i>Plasmopara viticola</i>	Control de temperatura, pluges, humitat relativa i fenologia, si és possible de forma automàtica per a aplicació de modelització. Observació de símptomes en fulles per a la valoració del risc.	Cal actuar segons les indicacions del model. És aconsellable el primer tractament preventiu quan es complisca la regla dels "3 deus", encara que en raïm de vinificació pot esperar-se a primeres taques. Els tractaments posteriors es donaran en funció del període d'incubació, persistència dels fungicides utilitzats i risc segons factors climàtics. És aconsellable un tractament preventiu a l'inici de floració amb un fungicida sistèmic.	Productes cùprics (R) Azoxistrobin (R) (pen) (10) Piraclostrobin (R) (pen)(5) (6) (10) Piraclostrobin+Metiram (11) Dimetomorf (pen) (4) (10) Cimoxanil (pen) (5) (10) Famoxadona (pen) (5) (10) Famoxadona+Cimoxamil (4) Famoxadona+Mancoceb (11) Fosetyl-Al (sist) (10) Benalaxil (sist) (5) (10) Metalaxil-M (mefenoxam) (sist) (5) (10) Iprovalicarb (sist) (5) (6) (10) Iprovalicarb+Fosetyl-AL+Mancozeb (11) Mancozeb Maneb Metiram Capten (3) Folpet (3) Ciazofamida (10) Zoxamida (5) (10) Metalaxil (sist) (5) (10) Ciazofamida (10) Benalaxil M (kiralaxil) (5) (10)	Poda en verd per a afavorir l'aireig. Cal eliminar rebrots del tronc. Cal limitar l'adobament per a evitar excessiu vigor. Cal alternar matèries actives.

ANNEX VI
Estratègia de control integrat (cont. 6)

MALALTIA	METODOLOGIA SEGUIMENT (*)	ESTRATÈGIA D'INTERVENCIÓ	CONTROL QUÍMIC O BIOTÈCNIC: MATÈRIES ACTIVES	MÈTODES CULTURALS
Oïdi <i>Uncinula necator</i>	Observació de brots i xanglots per a la detecció de símptomes. Utilització d'estacions meteorològiques automàtiques per a la valoració del risc.	Malaltia endèmica que requereix tractaments preventius. El període de màxim risc es localitza entre floració i verol. Com a mínim es recomanen 3 aplicacions (inici floració, grans grandària pésol i abans del verol), encara que este nombre es pot incrementar en el cas de condicions climàtiques favorables i sensibilitat varietal, respectant la persistència dels productes utilitzats. Es recomana l'ocupació d'estacions meteorològiques avisadores automàtiques. Es recomana no tractar a partir del verol.	Sofre (R) (3) Azoxistrobin (R) (10) Kresoxim-metil (R) (10) Trifloxistrobin (R) (10) (4) Piraclostrobin (R) (6) (10) Dinocap (6) Quinoxifen Permanganat potàssic Ciproconazol (4) Fenbuconazol (4) (11) Fluquinconazol (4) Flusilazol (4) Myclobutanil (4) Penconazol (4) Tebuconazol (4) Tetraconazol (4) Triadimenol (4) Proquinacid (11) Metrafenona (4) (10) Cal alternar matèries actives, amb mecanismes d'acció distints.	Podes en verd per a afavorir l'aireig i la penetració dels fungicides. Sistemes de formació que afavorisquen l'aireig. Crema de restes de poda afectats. Cal limitar l'adobament per a evitar excessiu vigor.
Podridura grisa del raïm <i>Botrytis cinerea</i>	Control de factors climàtics per a estimar el risc. Si és possible, cal utilitzar estacions meteorològiques automàtiques. Observació de xanglots per a detecció de símptomes des de l'inici de la floració al qualitat i des de l'inici de la maduració a la recol·lecció.	En maduració de raïm de taula són aconsellables tractaments preventius en períodes de risc (regla 15-15), especialment en floració, a inici del verol i 3-4 setmanes abans de la verema. En el cas de raïm de taula embutxacada es realitzarà un tractament preventiu fix abans d'embutxacar. Si es disposa d'estacions meteorològiques automàtiques, cal seguir les indicacions de risc del model.	Iprodiona Metil-tiofanat Folpet (3) Fenhexamida Mepanipirim (11) Boscalida Ciprodinil Fludioxonil Pirimetanil Màxim 3-4 aplicac./any no repetint productes de la mateixa família més de 2 vegades.	Ocupació de portaempelts poc vigorosos. Ocupació de varietats poc sensibles. Evitar cultius molt vigorosos. Poda equilibrada i esfullament o escavallament per a facilitar l'aireig. Cal evitar tota classe de ferides en les baies. Cal evitar, si és possible, estrès hídric.

ANNEX VI
Estratègia de control integrat (cont. 7)

MALALTIA	METODOLOGIA SEGUIMENT (*)	ESTRATÈGIA D'INTERVENCIÓ	CONTROL QUÍMIC O BIOTÈCNIC: MATÈRIES ACTIVES	MÈTODES CULTURALS
Podridura àcida <i>Acetobacter</i> sp., <i>Kloeoclera apiculata</i> , <i>Saccharomyces viti</i> i secundàries <i>Aspergillus niger</i> , <i>Alternaria</i> sp., <i>Rhizopus nigricans</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Penicillium</i> sp.	Cal observar la presència de danys en xanglots des de l'inici de la maduresa.		Les indicades per a la podridura grisa. Suprimir els rebutjos de cellers o restes de xanglots.	
Excoriosi <i>Phomopsis viticola</i>	Observació de símptomes en brotació i durant la poda per a detectar els danys en la base dels brots i els xanglots.	Són preferibles les pràctiques culturals, però en cas de danys d'una certa consideració poden efectuar-se tractaments després del desborrament, protegint especialment els estats fenològics D i E, quan les condicions meteorològiques siguin les adequades.	Mancozeb Metiram Folpet (3) Màxim 2 aplicac./any.	Cal eliminar fusta amb símptomes durant la poda. Cal cremar restes de poda. No s'ha de prendre material per a empeltar de plantes afectades.
Black-rot <i>Guignardia bidwellii</i>	Observació de primeres taques en fulles i posteriorment atacs en xanglot. Control de temperatures i pluges.	Aplicacions preventives en cas de condicions favorables (temperatures superiors a 10 °C i pluges), des del desborrament, en zones on s'han observat danys en anys anteriors.	Mancozeb Metiram Miclobutanol (4) Cimoxanil + Sulfat cuprocàlcic Màxim 2 aplicac./any.	Cal eliminar vinyes abandonades. Cal cremar restes de poda. En el treball mecànic és preferible un conreu primerenc a la primavera per a soterrar l'inòcul.

ANNEX VI
Estratègia de control integrat (cont. 8)

MALALTIA	METODOLOGIA SEGUIMENT (*)	ESTRATÈGIA D'INTERVENCIÓ	CONTROL QUÍMIC O BIOTÈCNIC: MATÈRIES ACTIVES	MÈTODES CULTURALS
Fongs de la fusta (llampat dels ceps, eutipiosis i altres)	<p>Observació de símptomes i en cas de dubte diagnòstic de laboratori.</p> <p>Marcatge de ceps per a intervinde de forma específica sobre estos durant la parada vegetativa.</p>	Només pràctiques culturals.		<p>Cal utilitzar material de plantació o reproducció sa.</p> <p>Cal retardar la poda hivernal i realitzar-la en temps sec desinfectant els estris de poda entre planta i planta.</p> <p>Cal començar la poda per plantes sense símptomes.</p> <p>Cal procurar fer els talls de poda verticals.</p> <p>S'han d'evitar grans talls de poda. En cas d'efectuar-se, cal aplicar-hi un màstic protector/cicatrizzant.</p> <p>Cal cremar les restes de poda de ceps afectats.</p> <p>En cas de ceps molt afectats s'han d'arrancar i cremar.</p> <p>En el cas particular d'atacs d'eutipiosi es pot realitzar una poda severa fins a aconseguir fusta sana per a forçar el rebrot del cep.</p> <p>En el cas d'atacs de llampat dels ceps amb ceps parcialment afectats, es pot eliminar per mitjà de poda la part afectada; es desinfecten les tisores de podar i s'aplica màstic protector a la ferida.</p> <p>També és útil el mètode tradicional d'obrir el tronc amb una destral i s'impeditx que es tanque col·locant una pedra (el fong no pot sobreviure en presència d'aire).</p> <p>En les noves plantacions cal evitar les situacions d'estrés.</p>

ANEJO VI
ESTRATEGIA DE CONTROL INTEGRADO

PLAGA	METODOLOGÍA SEGUIMIENTO (*)	CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: UMBRALES	CONTROL QUÍMICO O BIOTÉCNICO: MATERIAS ACTIVAS	CONTROL BIOLÓGICO Y FAUNA AUXILIAR	MÉTODOS CULTURALES
Polilla del racimo <i>Lobesia botrana</i>	Capturas de adultos en trampas sexuales y/o alimenticias y observación de huevos y larvas en 100 racimos (4 racimos/cepa de distintas orientaciones, en 25 cepas).	En 1 ^a generación no se recomienda intervenir. En 2 ^a y 3 ^a generación en uva de mesa intervenir al superar el 1% de racimos atacados. En uva de vinificación intervenir cuando se superen el 10% de racimos con presencia de plaga en 2 ^a generación y el 5% en 3 ^a generación.	Confusión sexual (R) Tebufenocida (R) Flufenoxuron (R) Metoxifenoctide (R) Clorpirifos (1) Metil clorpirifos (1) (6) <i>Spinosad</i> (R) <i>Fenoxicarb</i> Indoxacarb (9) Aplicación, si es posible, localizada en los racimos. Máximo 2 aplicaciones contra cada una de las generaciones carpófagas.	<i>Bacillus thuringiensis</i> (R) <i>Dibrachys affinis</i> <i>Dibrachys cavus</i> <i>Campoplex capitator</i> <i>Crysopa carnea</i> <i>Coccinélidos</i>	Poda en verde (deshojado y desnietado) para facilitar la ventilación y exposición de los racimos.
Cotonet o melazo <i>Planococcus citri</i>	En invierno observar el % de cepas con presencia del insecto. En vegetación observar el % de brotes y/o racimos atacados a partir del cuajado de frutos.	Intervenir sólo en uva de mesa. Se efectuará el tratamiento invernal cuando se supere el 3% de cepas atacadas. En vegetación se tratará cuando se superen el 2% de brotes o el 1% de racimos atacados aprovechando el tratamiento contra la 2 ^a generación de polilla.	Clorpirifos (1) Imidacloprid (1) Metil clorpirifos (invierno) Se recomienda, si es posible, la aplicación a focos o rodales o sólo a las plantas afectadas. Máximo 2 tratamientos en vegetación.	<i>Crytolaemus montrouzieri</i> <i>Leptomastix dactylopii</i> <i>Anagyrus pseudococci</i> <i>Leptomastoidea abnormis</i> <i>Prochiloneurus bolivari</i> <i>Signiphora conjugalis</i> <i>Coccinella septempunctata</i> <i>Chilocorus bipustulatus</i> <i>Scymus sp.</i>	Descortezado de troncos y brazos durante el invierno y quema posterior de los restos. Poda en verde para favorecer la aireación e impedir el excesivo sombreado.

ANEJO VI

ESTRATEGIA DE CONTROL INTEGRADO (Cont. 2)

PLAGA	METODOLOGÍA SEGUIMIENTO (*)	CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: UMBRALES	CONTROL QUÍMICO O BIOTÉCNICO: MATERIAS ACTIVAS	CONTROL BIOLÓGICO Y FAUNA AUXILIAR	MÉTODOS CULTURALES
Mosquito verde <i>Empoasca sp.</i> <i>Jacobiasca sp.</i>	Trampas cromatóricas amarillas. Se observará el número de insectos por hoja (en 100 hojas de la zona intermedia del sarmiento) antes de tratar la 2 ^a y 3 ^a generación de polilla.	Al detectar aumentos importantes de capturas en trampas y cuando se supere 2 insecto/hoja en 2 ^a gen. de polilla y 1 insectos/hoja en 3 ^a gen. de polilla.	Flufenoxuron (R) Clorpirifos (1) Acrinatrin (12) Imidacloprid (1) Máximo 2 aplicac./año salvo casos excepcionales.	<i>Anagrus atomus</i>	
Trips de las flores <i>Frankliniella occidentalis</i>	Se observará el número de formas móviles tras golpeo de 100 racimos desde el inicio de la floración hasta una semana después de finalizada dicha floración. Trampas cromatóricas azules.	Sólo se tratará en uva de mesa con un umbral de 0.25 formas móviles por racimo.	Meticarb (2) (hasta floración) Spinosad (R) Acrinatrín (12) Máximo 1 aplicación/año.	<i>Orius sp.</i> <i>Crysopa sp.</i>	Eliminar las malas hierbas antes del estado fenológico D-E (salida y extensión de hojas), pero no durante el periodo de floración-cuajado.
Gusanos grises <i>Agrotis sp.</i> y otros	Observación de cepas durante el desborre, observando los primeros daños en la brotación.	Si se observan yemas mordidas.	Clorpirifos	<i>Apanteles ruflorus</i> <i>Ichneumon sarcitorius</i> <i>Amblyteles armatus</i> <i>Campoletis annulata</i> <i>Entomophthora megasperma</i> <i>Meteorus rubens</i>	Mantener las malas hierbas en primavera hasta el estado E, al menos en la hilera y eliminarlas en verano.
Altica <i>Haltica ampelophaga</i>	Observación de adultos y puestas en brotes y hojas desde el inicio de la brotación hasta la floración.	Normalmente no requiere intervención por el control biológico natural.	Clorpirifos (1)	<i>Zicrona caerulea</i>	

ANEJO VI

ESTRATEGIA DE CONTROL INTEGRADO (Cont. 3)

PLAGA	METODOLOGÍA SEGUIMIENTO (*)	CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: UMBRALES	CONTROL QUÍMICO O BIOTÉCNICO: MATERIAS ACTIVAS	CONTROL BIOLÓGICO Y FAUNA AUXILIAR	MÉTODOS CULTURALES
Castañeta <i>Vesperus xatarti</i>	Trampas luminosas y/o sexuales de captura de adultos. Se observará del % de eclosión de huevos en cepas ocupadas o trampas de puesta.	Donde se observen síntomas de daño realizar un tratamiento a la eclosión de primeros huevos. El tratamiento será localizado en el suelo alrededor de la cepa.	Clorpirifos Máximo 1 – 2 aplicac./año.	Nemátodos <i>Steinerma</i>	Trampas de puesta en otoño y retirada en invierno. Eliminar las cepas muy atacadas.
Pulgones	<i>Observación de 100 brotes y 100 racimos desde prefloración (estado G) hasta grano tamaño guisante.</i> <i>Máxima sensibilidad en floración-cuaulado.</i>	Cuando se sobrepase el 5-10% de racimos con presencia de pulgón.	Imidaclorpid, sólo en el periodo de floración-cuaulado.	Coccinelidos Crisópidos	Poda en verde.
Mosca de la fruta <i>Ceratitis capitata</i> y otros dípteros	<i>Capturas en trampas alimenticias y/o sexuales.</i> <i>Observación del % de racimos atacados.</i>	Sólo en uva de mesa a primeras capturas y/o cuando se supere el 1% de racimos atacados.	Captura masiva de adultos en trampas alimenticias y/o sexuales.		Eliminar frutas afectadas. Control de frutales próximos.
Araña amarilla <i>Tetranychus urticae</i>	<i>Observación del % de cepas con síntomas y complementariamente la presencia de formas móviles en hojas desde inicio de floración hasta inicio de envero.</i>	- En uva de mesa tratar al observar los primeros focos, preferiblemente de forma localizada. Si el ataque es generalizado se actuará en toda la parcela.	Hexitiazox (2) Fenbutestan (2) Acrinatrin (12) Propargita (2) (6) Clofentecin (6) Fenpiroximato (2) Spirodiclofen (11) Procurar realizar el tratamiento sólo a los focos iniciales.	En general importante y suficiente: <i>Typhlodromus phialatus</i> <i>Euseius scutalis</i> <i>Euseius stipulatus</i> <i>Amblyseius californicus</i> <i>Amblyseilla setosa</i> <i>Typhlodromus piri</i>	Eliminar las malas hierbas antes del inicio de la brotación. Elegir los plaguicidas contra otras plagas menos perjudiciales para los fitoseídos útiles.

ANEJO VI

ESTRATEGIA DE CONTROL INTEGRADO (Cont. 4)

PLAGA	METODOLOGÍA SEGUIMIENTO (*)	CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: UMBRALES	CONTROL QUÍMICO O BIOTÉCNICO: MATERIAS ACTIVAS	CONTROL BIOLÓGICO Y FAUNA AUXILIAR	MÉTODOS CULTURALES
Araña amarilla <i>Tetranychus urticae</i>		<p>- En uva de vinificación actuar sólo cuando se sobrepasen estos umbrales:</p> <p>Inicio de floración: 5% de cepas con síntomas.</p> <p>Trat. 2ª gen. de polilla del racimo: 25% de cepas con síntomas.</p> <p>2-3 semanas más tarde: 40% de cepas con síntomas.</p>	Máximo 2 aplicac./año.	<p>Typhlodromus rhenanoides</p> <p>Phytoseiulus persimilis</p> <p>Anthoseius rhenanuidos</p> <p>Amblyseius isotrichus</p> <p>Typhlodromus carmonae</p> <p>Stethorus punctillum</p> <p>Crisopidos</p>	
Araña roja <i>Panonychus ulmi</i>	<p>En invierno observar el % de pulgares ocupados por puestas.</p> <p>En vegetación observar el % de hojas ocupadas por formas móviles.</p>	<p>Se actuará cuando se sobrepasen estos niveles:</p> <p>Invierno: 20% pulgares ocupados.</p> <p>Vegetación: Estados E/F hasta verano: 20-25% hojas ocupadas.</p> <p>Parada verano: 15-20% hojas ocupadas.</p>	<p>Hexitiazox (2)</p> <p>Fenbutestan (2)</p> <p>Acrinatrin (8)</p> <p>Propargita (2) (6)</p> <p>Fenpiroximato (2)</p> <p>Piridaben (2)</p> <p>Clofentecin (6)</p> <p>Spirodiclofen (11)</p> <p>Máximo 2 aplicac./año.</p>	<p>La misma que la araña amarilla, que suele controlar de forma natural a la plaga.</p>	<p>Quemar la madera de poda.</p> <p>Elegir los plaguicidas contra otras plagas menos perjudiciales para sus enemigos naturales (fitoseídos).</p>
Acaro de la roña <i>Brevipalpus lewisi y Eriosis</i> <i>Eriophyes vitis</i>	Observación del % de brotes o racimos afectados en prefloración.	No superar el 1% en uva de mesa o el 5% en uva de vino de brotes o racimos afectados, en el caso del ácaro de la roña, y síntomas notables en brotación en el caso de la eriosis.	<p>Azufre en espolvoreo (R) (4).</p> <p>Máximo 1 aplicación/año.</p>		

ANEJO VI

ESTRATEGIA DE CONTROL INTEGRADO (Cont. 5)

PLAGA	METODOLOGÍA SEGUIMIENTO (*)	CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: UMBRALES	CONTROL QUÍMICO O BIOTÉCNICO: MATERIAS ACTIVAS	CONTROL BIOLÓGICO Y FAUNA AUXILIAR	MÉTODOS CULTURALES
Acariosis <i>Calipitrimerus vitis</i>	Observación de 100 hojas terminales al trasluz en vegetación. Observación de 100 yemas después de la poda invernal.	50-100 acaros/hoja en vegetación o 1-3 acaros/yema en invierno.	En vegetación: Azufre en espolvoreo (R) (4) (9) Máximo 1 aplicación/año.	<i>Typhlodromus pyri</i>	Quemar restos de poda. No injertar sarmientos de parcelas atacadas.

ENFERMEDAD	METODOLOGÍA SEGUIMIENTO (*)	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN	CONTROL QUÍMICO O BIOTÉCNICO: MATERIAS ACTIVAS	MÉTODOS CULTURALES
Mildiu <i>Plasmopara viticola</i>	Control de temperatura, lluvias, humedad relativa y fenología, a ser posible de forma automática para aplicación de modelización. Observación de síntomas en hojas para la valoración del riesgo.	Actuar según las indicaciones del modelo. Es aconsejable el primer tratamiento preventivo cuando se cumpla la regla de los "3 dieces", aunque en uva de vinificación puede esperarse a primeras manchas. Los posteriores tratamientos se darán en función del periodo de incubación, persistencia de los fungicidas empleados y riesgo según factores climáticos. Es aconsejable un tratamiento preventivo al inicio de floración con un fungicida sistémico.	Productos cúpricos (R) Azoxistrobin (R) (pen) (10) Piraclostrobin (R) (pen) (5) (6) (10) Piraclostrobin+Metiram (11) Dimetomorf (pen) (4) (10) Cimoxanilo (pen) (5) (10) Famoxadona (pen) (5) (10) Famoxadona+Cimoxamil o (4) Famoxadona+Mancoceb (11) Fosetyl-Al (sist) (10) Benalaxil (sist) (5) (10) Metalaxil-M (mefenoxam) (sist) (5) (10) Iprovalicarb (sist) (5) (6) (10) Iprovalicarb+Fosetyl-Al+Mancoceb (11) Mancozeb Maneb Metiram Captan (3) Folpet (3) Ciazofamida (10) Zoxamida (5) (10) Metalaxil (sist) (5) (10) Ciazofamida (10) Benalaxil M (kiralaxil) (5) (10) Alternar materias activas.	Poda en verde para favorecer la aireación. Eliminar rebrotos del tronco. Limitar el abonado para evitar excesivo vigor.

ANEJO VI

ESTRATEGIA DE CONTROL INTEGRADO (Cont. 6)

ENFERMEDAD	METODOLOGÍA SEGUIMIENTO (*)	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN	CONTROL QUÍMICO O BIOTÉCNICO: MATERIAS ACTIVAS	MÉTODOS CULTURALES
Oidio <i>Uncinula necator</i>	Observación de brotes y racimos para la detección de síntomas. Utilización de estaciones meteorológicas automáticas para la valoración del riesgo.	Enfermedad endémica que requiere tratamientos preventivos. El periodo de máximo riesgo se localiza entre floración y envero. Como mínimo se recomiendan 3 aplicaciones (inicio floración, granos tamaño guisante y antes del envero), aunque este número puede incrementarse en el caso de condiciones climáticas favorables y sensibilidad varietal, respetando la persistencia de los productos utilizados. Se recomienda el empleo de estaciones meteorológicas avisadoras automáticas. Se recomienda no tratar a partir del envero.	Azufre (R) (3) Azoxistrobin (R) (10) Kresoxim-metil (R) (10) Trifloxistrobin (R) (10) (4) Piraclostrobin (R) (6) (10) Dinocap (6) Quinoxifen Permanganato potásico Ciproconazol (4) Fenbuconazol (4) (11) Fluquinconazol (4) Flusilazol (4) Myclobutanil (4) Penconazol (4) Tebuconazol (4) Tetraconazol (4) Triadimenol (4) Proquinacid (11) Metrafenona (4) (10) Alternar materias activas, con mecanismos de acción distintos.	Podas en verde para favorecer la aireación y la penetración de los fungicidas. Sistemas de formación que favorezcan la aireación. Quema de restos de poda afectados. Limitar el abonado para evitar excesivo vigor.
Podredumbre gris <i>Botrytis cinerea</i>	Control de factores climáticos para estimar el riesgo. A ser posible utilizar estaciones meteorológicas automáticas. Observación de racimos para detección de síntomas desde el inicio de la floración al cuajado y desde el inicio de la maduración a la recolección.	En maduración de uva de mesa son aconsejables tratamientos preventivos en períodos de riesgo (regla 15-15), especialmente en floración, a inicio del envero y 3-4 semanas antes de la vendimia. En el caso de uva de mesa embolsada se realizará un tratamiento preventivo fijo antes de embolsar. Si se dispone de estaciones meteorológicas automáticas, seguir las indicaciones de riesgo del modelo.	Iprodiona Metil-tiofanato Folpet (3) Fenhexamida Mepanipirim (11) Boscalida Ciprodinil Fludioxonil Pirimetanil Máximo 3 – 4 aplicac./año, no repitiendo productos de la misma familia más de 2 veces.	Empleo de portainjertos poco vigorosos. Empleo de variedades poco sensibles. Evitar cultivos muy vigorosos. Poda equilibrada y deshojado o desnietado para facilitar la aireación. Evitar todo tipo de heridas en las bayas. Evitar, si es posible, estrés hídrico.

ANEJO VI

ESTRATEGIA DE CONTROL INTEGRADO (Cont. 7)

ENFERMEDAD	METODOLOGÍA SEGUIMIENTO (*)	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN	CONTROL QUÍMICO O BIOTÉCNICO: MATERIAS ACTIVAS	MÉTODOS CULTURALES
Podredumbre ácida <i>Acetobacter sp., Kloeoclera apiculata, Saccharomyces viti</i> y secundarias <i>Aspergillus niger, Alternaria sp., Rhizopus nigricans, Cladosporium herbarum, Penicillium sp.</i>	Observar la presencia de daños en racimos desde el inicio de la madurez.			Las indicadas para la podredumbre gris. Suprimir los desechos de bodegas o restos de racimos.
Excoriosis <i>Phomopsis viticola</i>	Observación de síntomas en brotación y durante la poda para detectar los daños en la base de los brotes y los racimos.	Son preferibles las prácticas culturales, pero en caso de daños de cierta consideración pueden efectuarse tratamientos después el desborre, protegiendo especialmente los estados fenológicos D y E, cuando las condiciones meteorológicas sean las adecuadas.	Mancozeb Metiram Folpet (3) Máximo 2 aplicac./año.	Eliminar madera con síntomas durante la poda. Quemar restos de poda. No tomar material para injertar de plantas afectadas.
Black-rot <i>Guignardia bidwellii</i>	Observación de primeras manchas en hojas y posteriormente ataques en racimo. Control de temperaturas y lluvias.	Aplicaciones preventivas en caso de condiciones favorables (temperaturas superiores a 10 °C y lluvias), desde el desborre, en zonas donde se hayan observado daños en años anteriores.	Mancozeb Metiram Miclobutanol (4) Cimoxanilo + Sulfato cuprocálcico Máximo aplicac./año.	2 Eliminar viñas abandonadas. Quemar restos de poda. En el laboreo mecánico es preferible una labor temprana en primavera para enterrar el inóculo.

ANEJO VI

ESTRATEGIA DE CONTROL INTEGRADO (Cont. 8)

ENFERMEDAD	METODOLOGÍA SEGUIMIENTO (*)	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN	CONTROL QUÍMICO O BIOTÉCNICO: MATERIAS ACTIVAS	MÉTODOS CULTURALES
<i>Hongos de la madera</i> (yesca, eutipiosis y otros)	Observación de síntomas y en caso de duda diagnóstico de laboratorio. Marcaje de cepas para intervenir de forma específica sobre ellas durante la parada vegetativa.	Sólo prácticas culturales.		<ul style="list-style-type: none"> Utilizar material de plantación o reproducción sano. Retrasar la poda invernal y realizarla en tiempo seco desinfectando los útiles de poda entre planta y planta. Comenzar la poda por plantas sin síntomas. Procurar hacer los cortes de poda verticales. Evitar grandes cortes de poda. Caso de efectuarse aplicar un masticador/cicatrizante. Quemar los restos de poda de cepas afectadas. En caso de cepas muy afectadas se deben arrancar y quemar. En el caso particular de ataques de eutipiosis se puede realizar una poda severa hasta alcanzar madera sana para forzar el rebrote de la cepa. En caso de ataques de yesca con cepas parcialmente afectadas, se puede eliminar mediante poda la parte afectada, desinfectando las tijeras de podar y aplicar mástic protector a la herida. También es útil el método tradicional de abrir el tronco con un hacha, impidiendo que se cierre colocando una piedra (el hongo no puede sobrevivir en presencia de aire). En las nuevas plantaciones evitar las situaciones de estrés.

ANNEX VI

Estratègia de control integrat (cont. i 9)

(*) Sistema de mostratge: excepte en els casos en què s'especifiqui el contrari, les observacions s'efectuaran en 100 ceps per unitat cultural homogènia.

(1) Màxim 2 aplicacions a l'any, independentment del paràsit que combaten.

(2) Màxim 1 aplicació a l'any, independentment del paràsit que combaten.

(3) Només en raïm de vinificació fins a l'inici de verol.

(4) Només fins a l'inici de verol.

(5) Només en mesclles.

(6) Només raïm de vinificació.

(7) Es podrà utilitzar només en el supòsit que se n'autoritze oficialment a Espanya l'ús pel Ministeri de Agricultura, Pesca i Alimentació.

(8) Només en raïm de taula i com a màxim una aplicació a l'any.

(9) Pendent d'autorització d'ús per a eixa finalitat. Es podrà utilitzar a partir de la seu autorització.

(10) Màxim 3 aplicacions a l'any.

(11) No autoritzat en parrals de vinya.

(12) Només en parrals de vinya

(R) Producte recomanat.

(pen) Producte penetrant.

(sist) Producte sistèmic.

Notes:

a) Les matèries actives indicades en este annex VI contra cada plaga poden ser utilitzades excepcionalment contra altres plagues, sempre que estiguin registrades contra estes i es respecten les restriccions establides en el reglament de producció integrada.

b) En situacions molt excepcionals poden autoritzar-se altres matèries actives no previstes en esta norma tècnica sempre que el seu ús estiga registrat en el cultiu i siga autoritzada per escrit la seu utilització per a la producció integrada en vinya per la Direcció General d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària, amb les condicions i limitacions que assenyale l'autorització.

c) El fet que un organisme aparega esmentat en l'annex VI no obliga l'operador a realitzar-ne el seguiment. No obstant això, el no seguiment d'algun d'estos organismes, com que no constitueix plaga en la zona de cultiu, ha d'estar degudament justificat.

d) No obstant la previsió de matèries actives admeses en els annexos V i VI en el cultiu de la vinya, i ateses les freqüents renovacions o canvis en les condicions d'ús, el responsable de l'explotació ha de verificar abans del seu ús la vigència de l'autorització del formulat comercial i de l'ús i cultiu per al qual l'haja d'utilitzar, per mitjà de la consulta corresponent al Registre Oficial de Productes Fitosanitaris del Ministeri de Agricultura, pesca i alimentació (adreça web: <http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/registro/menu.asp>).

ANEJO VI

Estrategia de control integrado (cont. y 9)

(*) Sistema de muestreo: salvo en los casos en que se especifique lo contrario, las observaciones se efectuarán en 100 cepas por unidad cultural homogénea.

(1) Máximo 2 aplicaciones al año, independientemente del parásito que combatan.

(2) Máximo 1 aplicación al año, independientemente del parásito que combatan.

(3) Sólo en uva de vinificación hasta inicio envero.

(4) Sólo hasta inicio de envero.

(5) Sólo en mezclas.

(6) Sólo uva de vinificación.

(7) Se podrá utilizar sólo en el supuesto que se autorice oficialmente en España su uso por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

(8) Sólo en uva de mesa y como máximo una aplicación al año.

(9) Pendiente de autorización de uso para esa finalidad. Se podrá utilizar a partir de su autorización.

(10) Máximo 3 aplicaciones al año.

(11) No autorizado en parrales de vid

(12) Sólo en parrales de vid

(R) Producto recomendado.

(pen) Producto penetrante.

(sist) Producto sistémico.

Notas:

a) Las materias activas indicadas en este anexo VI contra cada plaga, podrán excepcionalmente ser utilizadas contra otras plagas, siempre que estén registradas contra las mismas y se respeten las restricciones establecidas en el reglamento de producción integrada.

b) En situaciones muy excepcionales podrán autorizarse otras materias activas no contempladas en esta norma técnica siempre que, estando su uso registrado en el cultivo, sea autorizada por escrito su utilización para la producción integrada en vid por la Dirección General de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, con las condiciones y limitaciones que señale dicha autorización.

c) El hecho de que un organismo aparezca citado en el anexo VI no obliga al operador a realizar su seguimiento. No obstante, el no seguimiento de alguno de estos organismos, al no constituir plaga en dicha zona de cultivo, deberá estar debidamente justificado.

d) No obstante la previsión de materias activas admitidas en los anexos V y VI en el cultivo de la vid, y dados las frecuentes renovaciones o cambios en las condiciones de uso, el responsable de la explotación deberá verificar antes de su uso la vigencia de la autorización del formulado comercial y del uso y cultivo para el que lo vaya a emplear, mediante la correspondiente consulta al Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (dirección web: <http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/registro/>